

DIA-A-DIA

PERGUNTA (solicitante C, nº 705 / 99)

Gostaria de informações sobre o remédio anti-tabagismo ZYBAN®.

RESPOSTA

ZYBAN® é o nome de marca do medicamento cujo princípio ativo é a bupropiona, um agente antidepressivo.

Aplicações clínicas: A bupropiona é útil como uma alternativa para os outros antidepressivos e pode ser útil como um agente sinergista para uma monoterapia antidepressiva já estabelecida. A bupropiona também está indicada como um auxiliar no tratamento anti-tabagismo.

Dados da literatura técnico-científica confirmam a eficácia da bupropiona para este tratamento, tanto que foi aprovado, nos EUA, pela FDA (*Food and Drug Administration*) para uso como auxiliar no tratamento anti-tabágico por um período de sete a nove semanas, com ou sem administração concomitante de nicotina.

Cuidados: Os efeitos adversos mais comumente relacionados à bupropiona são: náusea, vômito, constipação, boca seca, agitação, insônia, cefaléia e tremor. Há também relatos de ocorrência de convulsões com o uso da bupropiona.

Sua utilização requer acompanhamento médico, devendo a prescrição ser em duas vias (uma via fica com o paciente e a outra via fica retida na farmácia) por tratar-se de medicamento de controle especial, de acordo com a Portaria nº 344 (Lista C1).

Este produto foi registrado pelo Ministério da Saúde do Brasil sob o mesmo nome (Zyban) e é produzido pela Glaxo Wellcome.

Referências

1. Drugdex®. CCIS – Micromedex Inc. vol.102, 1999.
2. ANVS. Internet: http://anvs1.saude.gov.br/base_2/MedicamentoProd_5_1.asp.

Respondido por: Rogério Hoefler

Estabilidade de medicamentos injetáveis

Pergunta (Solicitante HGB, nº 699 / 99)

Qual a estabilidade da ciprofloxacina, após diluição?

Resposta

Em solução de soro fisiológico (NaCl 0,9 %), glicose a 5% e Ringer e Ringer Lactato, a ciprofloxacina é quimicamente estável por 14 dias, à temperatura ambiente e protegida da luz. Apesar desta estabilidade, devido ao risco de contaminação microbólica do produto, sugere-se o descarte da solução 24 horas após o seu preparo, como medida de precaução.

Referências

1. Drug Facts and Comparisons. 52 ed. St. Louis: Facts and Comparisons, 1998.
2. TRISSEL, Lawrence A. *Handbook on injectable drugs*. 9 ed. Bethesda: American Society of Hospital Pharmacists, 1996

Respondido por Rogério Hoefler

PUBLICAÇÕES FUNDAMENTAIS EM FARMACOLOGIA E FARMACOLOGIA CLÍNICA

• FOYE, MEDICINAL CHEMISTRY • GOODMAN & GILMAN, PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS • KOROLKOVAS, DICONÁRIO TERAPEÚTICO GUANABARA • LUND, WALTER (ED): THE PHARMACEUTICAL CODEX • MARTINDALE: THE EXTRA PHARMACOPOEIA • OLIN, DRUG FACTS AND COMPARISONS • PDR GENERICS • PDR GUIDE TO DRUG INTERACTIONS SIDE EFFECTS INDICATIONS • PDR PHYSICIANS' DESK REFERENCE • PDR FOR NON-PRESCRIPTION DRUGS • RANG & DALE, PHARMACOLOGY • STEDMAN, DICONÁRIO MÉDICO • THE MERCK INDEX • USP XXIII + NATIONAL FORMULARY XVIII • USP DI - UNITED STATES PHARMACOPOEIA DRUG INFORMATION • USP DICTIONARY USAN • ZANINI, GUIA DE MEDICAMENTOS

LIVRARIA CIENTÍFICA ERNESTO REICHMANN

(1936 - 1996)

60 anos

DDG: 0800 - 12 - 1416

MATRIZ (Metrô República): Rua Dom José de Barros, 168, 6º andar. CEP: 01038-000
Centro São Paulo -SP; Tel: (011) 255-1342/214-3167; Tel/Fax: (011) 255-7501

FILIAL (Metrô Santa Cruz): Rua Napoleão de Barros, 639. CEP: 04024-002
Vila Clementino São Paulo - SP; Tel.: (011) 573-4381; Tel/Fax: (011) 575-3194

MICROMEDEX / DRUGDEX:

A melhor base de dados norte-americana em medicamentos. CD-ROM Professional Ltda.: 034-236-1096 (MG); 011-289-7628 (SP); 021-567-2229 (RJ).

E-mails: celso@triang.com.br (MG); cdromsp@hipernet.com.br (SP); cdromrj@ibm.net (RJ).